



ESCABIOSIS

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

TRATAMIENTO CON PERMETRINA 5% (TÓPICO)

- Córtese las uñas antes de iniciar el tratamiento
- Lávese todo el cuerpo antes de aplicar la crema
- Aplique una capa de crema de permetrina sobre **toda la superficie** del cuerpo bien seca, desde la mandíbula hasta los pies haciendo especial hincapié en los espacios entre los dedos, las muñecas, los tobillos, debajo de las uñas, entre las nalgas, bajo los pechos y en los genitales externos
- No se lave las manos tras aplicar el tratamiento
- Deje actuar la crema durante al menos 12 horas
- Utilice ropa limpia detrás

Importante: El tratamiento individual debe comenzar a la vez que el de los contactos estrechos y convivientes (con un margen de 24 horas)

El proceso se ha de repetir tras el tiempo indicado (generalmente una semana)

TRATAMIENTO CON IVERMECTINA (ORAL)

- Debe tomar todos los comprimidos pautados a la vez y **tras dos horas de ayuno**.
No consuma alimentos al menos **hasta 30 minutos** después de la toma del fármaco

Importante: El tratamiento individual debe comenzar a la vez que el de los contactos estrechos y convivientes (con un margen de 24 horas).

El proceso se ha de repetir tras el tiempo indicado

MEDIDAS HIGIÉNICAS Y CONDUCTUALES

- Inicie las medidas de a continuación a la vez que el tratamiento médico
- La ropa y material lavable se pondrá en la lavadora con agua caliente mínimo 10 minutos a 50°C o en un ciclo caliente durante 20 minutos
- La ropa que no se pueda lavar directamente se debe de poner en bolsas de plástico bien cerradas durante 8 días y a continuación ventilar 24 horas
- El mobiliario se limpiará de forma rutinaria con lejía o limpieza a vapor que alcance temperaturas mayores de 120°C
- La ropa y las toallas serán de uso individual
- Si tiene mascota, comprobar si tiene lesiones cutáneas. De ser así, consulte con su veterinario
- Debe aislarse al menos 24 horas tras finalizar el tratamiento
- El picor puede persistir hasta 4 semanas una vez haya terminado el tratamiento